

Mogelijke oorzaken van achteruitgang van de Grote Karekiet zijn eutrofiëring, verlanding, verdroging en een onjuist beheer. Deze processen kunnen leiden tot een slechte habitatkwaliteit, een laag voedselaanbod en een hoge predatiedruk. Er wordt onderzocht in hoeverre het voorkomen en het broedsucces samenhangen met de aanwezigheid van waterriet en overjarig riet, met de stengeldikte en andere rieteigenschappen, met het insektenaanbod en de predatiedruk. Met behulp van kunstieren en kunstnesten wordt nagegaan wat de predatoren zijn en in hoeverre de kans op predatie samenhangt met de aanwezigheid van bosopslag en met de grootte van rietvelden. Door middel van het kleurringen van ouders en jongen wordt geprobeerd de overleving en de uitwisseling tussen gebieden in kaart te brengen. De belangrijkste studiegebieden zijn De Weerribben, een laagveenmoeras in NW-Overijssel, en het Zwarte Meer, een randmeer van het IJsselmeer.

Hulp van waarnemers bij dit onderzoek is van harte welkom. Men kan bijdragen door precies te noteren wanneer mannetjes in een gebied arriveren, waar ze zingen, wat hun eventuele kleurcode is en of en wanneer ze een vrouwtje krijgen. Het moment van paarvorming is eenvoudig herkenbaar door de verandering van het type zang.

### **Wat is er met de Boomvalk aan de hand?**

ROB G. BIJLSMA

De Boomvalk is in delen van Drenthe en de Veluwe recent fors in aantal afgenomen, nadat de stand vele jaren lang stabiel was. Een belangrijke reden zou kunnen zijn: de sterke toename van de Havik. Door toedoen van deze superpredator onder de Nederlandse roofvogels blijken in sommige gebieden amper nesten van Boomvalken succesvol uit te vliegen. Doordat Boomvalken vrij oud kunnen worden, valt het ontbreken van voldoende nage-

slacht pas op wanneer de oude vogels de pijp uit zijn. Een plotselinge afname van de broedvogelstand is het gevolg. Overigens wordt niet verwacht dat de Boomvalk als gevolg van havikpredatie zal verdwijnen; stabilisatie op laag niveau ligt meer voor de hand. Om meer aan de weet te komen moet monitoring meer zijn dan braaf karteringsrondjes lopen en stipjes zetten. Het vaststellen van een trend is niet genoeg, het vinden van een verklaring moet het uiteindelijke doel zijn. Kies een onderzoeksobject uit en let o.a. op of in een territorium daadwerkelijk gebroed wordt, hoe de resultaten zijn enz. Dit kost tijd, maar levert onmisbare informatie op bij de interpretatie van trends. Wat de Boomvalk betreft zijn er vragen te over. Hoe zit het in de rest van het land? Is het beeld van de Veluwe en Drenthe algemeen geldend? Vooral de situatie in de duinen is interessant, aangezien hier tot voor kort geen Haviken voorkwamen en Boomvalken er talrijk zijn.

---

*Theo Verstrael, Centraal Bureau voor de Statistiek*

*Heiner Flinks, Am Kulm 19, 46325 Borken, Duitsland*

*Tibor Szép, Hungarian Ornithological Society*

*Jouke Prop, Vogeltelgroep Dollard*

*Kees Camphuysen, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee*

*Jaap Graveland, Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek / DLO*

*Rob G. Bijlsma, Doldersummerweg 1, 7983 LD Wapse*



*Limosa 69 (1996) 1*